

ČIPOVANIE VAKCINÁCIA PSOV A MAČIEK



ČIPOVANIE

Čipovanie je najrozumnejším opatrením týkajúcim sa najmä zamedzeniu straty psa.

Vďaka čipu sa pes ľahko navráti k svojmu majiteľovi.

V našej ambulancii používame iba mikročipy, ktoré aplikujeme do ľavej strany krku alebo medzi lopatky. Ide o veľmi jednoduchý rýchly ambulantný úkon, ktorý je pre zvieru bezpečný.

Čip neslúži ako GPS.

Ide o 15 miestny číselný kód, ktorý sa zapisuje do Centrálného registra spoločenských zvierat.

Po začipovaní môže byť psíkovi vystavený medzinárodný Petpass, s ktorým môže celosvetovo cestovať.



VAKCINÁCIA PSOV A MAČIEK

V našej ambulancii kladieme veľký dôraz na preventívne vakcinácie proti infekčným ochoreniam. Infekčné ochorenia sa prevakcinujú každoročne, zatiaľ čo besnota každý rok, dva alebo tri.

Vakcinujeme iba **zdravé zvieratká**.



VAKCINAČNÁ SCHÉMA PSA:

Vo veku 6.-8. týždňov	DHPPi	psinka, infekčná hepatitída, laryngotracheitída, parvovírus a parainfluenza
Vo veku 8.-10. týždňov	DHPPi + L	psinka, infekčná hepatitída, laryngotracheitída, parvovírus, parainfluenza a leptospiroza
Vo veku 12. týždňov	DHPPi + LR	psinka, infekčná hepatitída, laryngotracheitída, parvovírus, parainfluenza, leptospiroza a besnota
Každoročná revakcinácia	DHPPi + LR	psinka, infekčná hepatitída, laryngotracheitída, parvovírus, parainfluenza, leptospiroza a besnota
Každoročná doplnková vakcinácia	KC intranazálna	kotercový kašeľ

VAKCINAČNÁ SCHÉMA MAČKY:

Vo veku 8.- 9. týždňov	RCP RCPCh RCPCh FeLV	rinotracheitída, calicivirus, panleukopénia rinotracheitída, calicivirus, panleukopénia a chlamýdia rinotracheitída, calicivirus, panleukopénia, chlamýdia a leukémia
Vo veku 12. týždňov	RCP + R RCPCh + R RCPCh FeLV + R	rinotracheitída, calicivirus, panleukopénia a besnota rinotracheitída, calicivirus, panleukopénia, chlamýdia a besnota rinotracheitída, calicivirus, panleukopénia, chlamýdia, leukémia a besnota
Každoročná revakcinácia	RCP + R RCPCh + R RCPCh FeLV + R	rinotracheitída, calicivirus, panleukopénia a besnota rinotracheitída, calicivirus, panleukopénia, chlamýdia a besnota rinotracheitída, calicivirus, panleukopénia, chlamýdia, leukémia a besnota

Vedľajšie účinky po vakcinácii: opuch v mieste vpichu, malátnosť, menšia aktivita, anafylaktický šok.

MVDr. Tomáš Mihok, PhD. | MVDr. Viktória Mihok, PhD.

Veterinárna ambulancia a psí salón, Timravy 3, 040 17 Košice-Barca